



## COMPOSITIONS

**Dekalin™ VT Tablet:** Each tablet contains Dequalinium Chloride BP 10 mg.

## DESCRIPTION

Dequalinium chloride, the active ingredient in **Dekalin VT**, belongs to the family of anti-infective and antiseptic drugs. Dequalinium chloride is active against the bacteria which cause bacterial vaginosis.

**Dekalin™ VT** is used for the treatment of bacterial vaginosis.

It is inserted into the vagina for the treatment of the site of infection.

## INDICATION

**Dekalin™ VT** vaginal tablets are indicated for the treatment of Bacterial vaginosis

The recommended dose is 1 vaginal tablet daily for 6 days.

## INSTRUCTION FOR USE

- Use every evening before bed.
- Wash your hands before opening the blister pack.
- Lie down in a reclining position with the legs slightly bent. Insert one vaginal tablet deeply into the vagina.
- You should stop the treatment during the heavy bleeding period of your menstruation and resume afterwards.
- Do not stop treatment early, even if you no longer have any discomfort (e.g. itching, discharge, smell). A treatment of less than 6 days may result in your symptoms returning.
- **Dekalin™ VT** contains ingredients which do not dissolve completely and the remains of the tablet are occasionally found in the underwear. This won't affect the effectiveness of the treatment. The tablet will not stain your underwear but for your own comfort you can use a sanitary towel or panty liner.
- If your vagina is dry, the vaginal tablet might not dissolve and be discharged as an intact tablet. As a consequence, the treatment is not optimal. In this case the vaginal tablet can be moistened with a drop of water before insertion.

If you have the impression that the effect of **Dekalin™ VT** is too strong or too weak, talk to your doctor or pharmacist.

## SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Most of the side effects are mild and short lived.

Sometimes the symptoms of vaginal infections (such as - Vaginal discharge, vaginal itching or vaginal burning, Vaginal yeast infection, thrush.) can get worse at the beginning of the treatment, before they start to get better. The treatment should be continued with the treatment, but if the complaints persist, please take

advice from doctors.

## Some other side effects

- Vaginal bleeding, vaginal pain
- Inflammation of vagina
- Headache
- Nausea

## CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients present in medication

Ulceration of the vaginal epithelium and the vaginal portion of the cervix.

Those who have not yet had their first menstruation, and thus did not reach sexual maturity must not use **Dekalin™ VT**.

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

Intravaginal use of soaps, spermicides and vaginal douches (vaginal washes) is not recommended during treatment with **Dekalin™ VT**. Treatment should be stopped during the heavy bleeding period of menstruation and resume afterwards.

As with all vaginal infections, unprotected sexual intercourse during treatment with **Dekalin™ VT** is prohibited.

To minimise exposure of the newborn to dequalinium chloride, vaginal tablets should not be used within 12 hours before birth.

## USE IN PREGNANCY AND BREASTFEEDING

Based on previous experience and since **Dekalin™ VT** acts locally, no harmful effects on pregnancy and/or the unborn and breast fed infant are expected. **Dekalin™ VT** should only be used during pregnancy and during breast-feeding if medically needed.

## Use in children and adolescents

There is insufficient experience of the use of **Dekalin™ VT** in children and adolescents under 18 years of age.

## Use in women above 55 years and elderly

There is insufficient experience of the use of **Dekalin™ VT** in women above 55 years

## STORAGE

Store below 30° C and dry place. Keep out of the reach of children.

## COMMERCIAL PACK

**Dekalin™ VT Tablet:** Each box contains 6 tablets in 1x6's Alu-PVC blister strips.



Manufactured by

**Nuvista Pharma Limited**

48, TONGI INDUSTRIAL AREA, GAZIPIUR, BANGLADESH

A subsidiary of BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD.

000000 V01

# ডেকালিত™ ভিটি

ডেক্যালিনিয়াম ক্লোরাইড ভেজাইনাল ট্যাবলেট

## উপাদান

ডেকালিত™ ভিটি ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ট্যাবলেটে আছে ডেক্যালিনিয়াম ক্লোরাইড বিপি ১০ মিঃ গ্রাঃ।

## বর্ণনা

ডেকালিত™ ভিটি এর সক্রিয় উপাদান ডেক্যালিনিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্টি-ইনফ্লেক্সিভ এবং এন্টিসেপটিক ঔষধ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ডেক্যালিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ভেজাইনোসিস এর বিরুদ্ধে সক্রিয়।

ডেক্যালিনিয়াম ক্লোরাইড ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ভেজাইনোসিসের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি যোনিতে সংক্রমণের জায়গায় চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

## নির্দেশাবলী

ডেকালিত™ ভিটি ভেজাইনাল ট্যাবলেট ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ভেজাইনোসিস এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। নির্ধারিত মাত্রা ১ টি করে ভেজাইনাল ট্যাবলেট পর পর ৬ দিন।

## ব্যবহারবিধি

- রাতে ঘুমানোর পূর্বে ব্যবহার করুন
- প্যাকেট খোলার পূর্বে ব্যবহার হাত ভালভাবে ধুয়ে নিন
- দু'পা দুইদিকে মৃদু সরিয়ে কিছুটা শুঁয়ে নিন। তারপর একটি ট্যাবলেট যোনির গভীরে প্রবেশ করান
- ঋতুশ্রাবের সময় অধিক রক্তক্ষরণ হলে, ট্যাবলেট ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলেই ব্যবহার শুরু করবেন
- কিছুটা সুস্থ অনুভব করলে কখনোই চিকিৎসা সম্পূর্ণ না করে বন্ধ করবেন না। এমতাবস্থায় ৬ দিনের কম ব্যবহারে রোগের পুনরাবৃত্তি হতে পারে
- ডেকালিত™ ভিটি এর সহকারী উপাদান গুলো যেহেতু, সম্পূর্ণ মিশে যায় না সে ক্ষেত্রে ব্যবহারের পর অন্তর্বাসে পাওয়া যাওয়াটা স্বাভাবিক। ইহা চিকিৎসায় কোন প্রভাব ফেলবে না। এই ট্যাবলেট আপনার অন্তর্বাসে কোন দাগ ফেলবে না কিন্তু নিজস্ব সুবিধার জন্য আপনি অন্তর্বাসে আবারনী ব্যবহার করতে পারেন
- যদি আপনার যোনি শুষ্ক হয় তাহলে সেটা কাল্পনিক স্থানে না গলার সম্ভাবনা থাকে এবং অক্ষত অবস্থায় যোনি থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এবকম হলে চিকিৎসা পূর্ণ হবে না। সেক্ষেত্রে ট্যাবলেটটি যোনিতে প্রবেশের পূর্বে কিছুটা পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে যোনিতে প্রবেশ করানো যেতে পারে
- আপনার যদি মনে হয় ডেকালিত™ ভিটি এর কার্যকারিতা খুবই দৃঢ় কিংবা দুর্বল সেক্ষেত্রে আপনি তা চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারেন

## পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সকল ওষুধের মতো, এই ওষুধটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, যদিও সকলের সেগুলি হয় না। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলির বেশিরভাগই হালকা এবং স্বল্পস্থায়ী।

রোগ ভাল হতে শুরু করার আগে কখনও কখনও যোনী সংক্রমণের লক্ষণগুলি (যেমন চুলকানি, জ্বলন এবং শ্রাব) চিকিৎসার শুরুতে আরও খারাপ হতে পারে। আপনার চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত, তবে অভিযোগগুলি যদি অব্যাহত থাকে তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরামর্শের জন্য আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করুন।

## আরও যেসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে

- যোনিতে রক্তপাত অথবা যোনিতে ব্যথা
- যোনিতে প্রদাহ
- মাথাব্যথা
- বমি বমি ভাব

## প্রতিদ্রব্ধ

- সক্রিয় পদার্থের বা তালিকাভুক্ত কোনও সহকারী উপাদানের সাথে সংবেদনশীলতা
- যোনিপথের এপিথেলিয়াম এবং জরায়ুর যোনি অংশের ক্ষত।
- অল্প বয়স্ক মেয়েদের যারা এখনও তাদের প্রথম ঋতুশ্রাব হয়নি এবং এইভাবে যৌন পরিপক্বতায় পৌঁছায়নি তাদের অবশ্যই ডেকালিত™ ভিটি ব্যবহার করা উচিত নয়।

## সতর্কতা

চিকিৎসাকালীন সময়ে যোনির মধ্যে সাবান, যোনি পরিষ্কারকারী দ্রব্যাদি অথবা শুক্রানু ধ্বংসকারী দ্রব্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ভারী ঋতুশ্রাবের সময় ডেকালিত™ ভিটি নেয়া থেকে বিরত থাকুন এবং অবস্থা স্বাভাবিক হলে পুনরায় ব্যবহার শুরু করুন।

যোনি প্রদাহের সময় অরক্ষিত সহবাস থেকে বিরত থাকুন।

নবজাতক জন্মের ১২ ঘন্টা পূর্বে নবজাতকের শারীরিক সতর্কতার জন্য ডেকালিত™ ভিটি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

## গর্ভাবস্থায় ব্যবহার

পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে এবং ডেকালিত™ ভিটি যেহেতু স্থানীয় ভাবে কাজ করে সেহেতু, গর্ভবতী মা, নবজাতক শিশু এবং মায়ের দুধ পান করা নবজাতক ওষুধের যেকোন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার বাইরে থাকবে। **শিশু ও বয়স্কিকালের ব্যবহারঃ** পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় শিশু এবং ১৮ বছরের নিচে রোগীদের ডেকালিত™ ভিটি ব্যবহার না করা শ্রেয়।

**৫৫ বয়সের মহিলাদের জন্য এর ব্যবহারঃ** এই বয়সের রোগীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে।

## সংরক্ষন

৩০° সেঃ এর নিচে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## বাণিজ্যিক প্যাক

ডেকালিত™ ভিটি ট্যাবলেটঃ প্রতিটি ব্যাগে ১x৬ এর আলু-পিভিসি ব্লিস্টার স্ট্রিপগুলিতে ৬ টি ট্যাবলেট থাকে।

  
care. unconditional.

প্রস্তুতকারকঃ

নুভিস্তা ফার্মা লিমিটেড

৪৮, টঙ্গী শিল্প এলাকা, গাজীপুর, বাংলাদেশ

বেল্লিকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর একটি সার্বসিডায়ারী প্রতিষ্ঠান